

Wścieklizna!



Wirus wścieklizny wędruje wzdłuż nerwów obwodowych z miejsca zakażenia do ośrodkowego układu nerwowego i tam namnaża się.

Okres wylęgania wirusa, czyli czas od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych symptomów choroby, wynosi **od 10 dni do 2 lat**. Długość tego okresu zależy od dawki zakażającej i miejsca wprowadzenia wirusa do organizmu.

Wścieklizna jest chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie i rdzeń kręgowy) ssaków, **w tym także ludzi**.

Na kilka dni (1-10) przed wystąpieniem klinicznych objawów choroby, wirus przedostaje się do ślinianek.

Do zakażenia wścieklizną dochodzi głównie w wyniku:

- pogryzienia przez chore zwierzę
- przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka.

Zwierząt chorych lub podejrzanych o wściekliznę nie należy dotykać, skórować, patroszyć.

Objawy wścieklizny u zwierząt:

- podwyższona ciepłota ciała
- nagła zmiana usposobienia zwierzęcia – łagodne stają się złośliwe i drażliwe, agresywne – spokojniejsze
- utrata wrodzonej bojaźliwości u zwierząt dzikich
- rozdrażnienie, niepokój
- wzmożone reakcje na bodźce zewnętrzne, ataki szału
- brak koordynacji ruchowej, niezdolność wzroku
- porażenie mięśni żuchwy, gardła, przełyku, ślinotok
- zaburzenia świadomości
- drgawki, otępienie, śpiączka

Objawy wścieklizny u człowieka:

- gorączka, ból głowy
- zaburzenia czucia w okolicy miejsca zakażenia
- wzmożona nerwowość i niepokój
- pobudzenie układu współczulnego przejawiające się m.in. łzawieniem, rozszerzeniem źrenic, potliwością wzmożonym wydzieleniem śliny
- bolesne skurcze mięśni gardła i przełyku przy przełykaniu
- ślinotok – z obawy przed bólem chory unika połykania śliny

Objawowe zakażenia wścieklizną kończą się śmiercią.

W przypadku pogryzienia człowieka przez chore lub podejrzanego o wściekliznę zwierzę należy:

- pozwolić aby krew przez jakiś czas swobodnie wypływała z rany
- przemyć ranę wodą z mydłem
- zdezynfekować ranę
- nałożyć opatrunek
- zgłosić się do lekarza

Lekarz ocenia stopień narażenia pacjenta na zakażenie wścieklizną i kwalifikuje do ewentualnych szczepień



Szczepionkę przeciwko wściekliznie podaje się ludziom domięśniowo w **5 dawkach** wg schematu: **0,3,7,14,30 dnia**. W przypadku gdy pogryzienia są rozległe, dotyczą głowy, karku, rąk oprócz szczepionki podaje się **surowicę** z przeciwciałami.

Zwierzęta podejrzanego o wściekliznę poddaje się **piętnastodniowej obserwacji**. W przypadku zwierząt padłych przeprowadza się **badania laboratoryjne**. Jeżeli zwierzę okaże się zdrowe, szczepienie pacjenta można przerwać.

Aby uniknąć wścieklizny należy:

- regularnie szczepić zwierzęta domowe – psy podlegają **obowiązkowym** szczepieniom 1 raz w roku; dla kotów szczepienia są **zalecane**
- nie dopuszczać do tego, aby psy i koty były wypuszczane z domu bez dozoru
- unikać kontaktów z obcymi zwierzętami domowymi i dzikimi – nie dotykać ich, nawet jeśli zachowują się bardzo przyjaźnie



**POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII W BRZESKU**

32 – 800 Brzesko, ul. Piastowska 2B

tel./ fax: (0 14) 66 34 750

✉ e-mail : brzesko.piw@wetgiw.gov.pl